
CODE ROUGE


RESTER CALME

EPISIO SI BESOIN




❶ Mac Roberts

- Cuisses dégagées des étriers
- Ramenées au maximum sur l'abdomen
- Les genoux au contact du thorax




Poing sus-pubien



Manœuvre de Couder

❷ Echec → Main et avant bras nus et savonnés sauf la paume ; droite si dos à gauche et gauche si dos à droite introduite en arrière → Epaule post atteinte


Wood inversé



Main se glisse en arrière de l'épaule post pour la faire tourner et la transformer en épaule antérieure avec changement de main si nécessaire

ET OU

Letellier



Main repère l'épaule, crochète l'aisselle, la décolle du plan post en l'amenant en avant puis la tire en avant et en bas ''en vrille''

❸ Echec ou épaule post non atteinte

Changer de main et se mettre à genou jusqu'au bout



Jacquemier

Introduction en arrière de la tête du côté opposé au dos – trajet vers le sinus sacro-iliaque opposé au dos, en suivant l'axe ombilico-coccygien vers l'épaule post – suit le membre jusqu'à la main – extraction du membre supérieur, sans se relever , en le faisant passer en avant du thorax du fœtus pour amener l'épaule postérieure en avant

JP Schaal, J Berthet – Dystocies des épaules : manoeuvres, « Mécanique & Techniques Obstétricales » 3ème édition - Sauramps Médical, Montpellier 2007, JP Schaal – p 529-536

Y Malinas, Dystocie des épaules : une minute pour survivre – La pratique médicale quotidienne, 1985, 211, 8-15