"Gynerisq Contrôle" utilisation Ocytocine pendant le Travail

- **Identification de la patiente :**

- **Identification de la sage femme :**

- **Indication ocytocine** Déclenchement artificiel ☐ Direction du travail ☐
  précisions indication :

- **Information patiente faite** ☐ **Salle de césarienne disponible** ☐

- **Présentation** – type : variété : Hauteur :

- **Col** : posit°: consistance : long : dilatat° :

- **Tracé RCF de 30mn avant ocytocine fait et interprété** ☐

- **CU/10mn =** **bon relâchement entre CU contrôlé** ☐

- **Début perfusion le, date :** **heure :**

- **Posologie de départ (mUI/mn)=**

Rappel : *Syntocinon, 1 ampoule de 5 UI dans 250 ml de sérum glucosé à 5% - perfusion avec pompe à débit contrôlé avec valve anti reflux – voie veineuse dédiée, spécifique – Augmentation de 2 à 4 mUI/mn toutes les 15mn pour obtenir, 3 à 4 CU/10mn avec un bon relâchement utérin et un RCF normal – La dose minimale efficace doit être utilisée. Le débit maximal habituel est de 20 mUI/mn et ne doit jamais excédé 32 mUI/ml*

Débit (mUI/mn)	Débit (ml/h)
2 mUI/mn	**6 ml/h**
4	12
6	18
8	24
10	30
12	**36**
14	42
16	48
18	54
20	60
22	66
24	**72**
26	78
28	84
30	90
32	**96**

Arrêt perfusion le **à** **Durée totale =**

Débit maximum utilisé (mUI/ml)=

Anomalies en cours de traitement : non ☐

tachysystolie (> 5CU/10mn pendant 20mn) ☐

Anomalies RCF ☐ heure :

précisions :

Mesures prises, évolution :